

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

2 Juillet 1982

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR et CORSE

(ALPES de HAUTE PROVENCE, HAUTES-ALPES, ALPES MARITIMES, BOUCHES-DU-RHONE, HAUTE-CORSE, CORSE SUD, VAR, VAUCLUSE, SUD de la DROME)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Siège de la circonscription : 24, Rue Edouard Delanglade - 13006 MARSEILLE

Station d'Avertissements : Quartier Cantarel - MONTFAVET Adresse Postale : B.P. 95 84140 MONTFAVET - TELEPHONE : (90) 88.21.83

ABONNEMENT ANNUEL : 85 F REGISSEUR DE RECETTES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE AVIGNON CCP MARSEILLE 9660 74 V

SPECIAL CORSE N°10

## VIGNE

### TORDEUSES DE LA GRAPPE -

Le vol de 2<sup>ème</sup> génération de *Cochylis* se poursuit en tous secteurs et d'assez nombreuses éclosions sont observées depuis quelques jours dans les zones habituellement infestées principalement la région Nord d'Aléria. En Corse du Sud les éclosions restent dans l'ensemble jusqu'à présent peu importantes.

Prévoir les traitements curatifs avec un produit à action de choc type parathion aux dates suivantes.

Vignoble de Marana, Casinca, plaine orientale, Patrimoine et Balagne aux environs du 10 Juillet.

Vignoble de Porto-Vecchio, Figari, Portolo, Sartène, Ajaccio aux environs du 15 Juillet.

Dans les vignes très sensibles au *Botrytis* cette intervention est fortement recommandée en complément du traitement préventif préconisé dans notre dernier Bulletin.

Par contre, dans les vignes peu sensibles on n'interviendra seulement si l'on observe plus de 10 % de grappes attaquées. Des précisions seront apportées dans notre prochain Bulletin prévu le 9 Juillet.

### BOTRYTIS -

Le deuxième traitement spécifique conseillé juste avant la fermeture de la grappe est à réaliser sans tarder. Cette intervention est très importante dans les vignes à haut rendement et en situations humides. On pourra l'effectuer en mélange avec l'insecticide contre les Tordeuses en prenant soin de bien viser les grappes.

### OIDIUM -

Cette maladie se développe sur grappes de manière inquiétante en toutes zones. Si ce n'est déjà fait appliquer sans tarder le poudrage de soufre conseillé dans notre précédent Bulletin. Intervenir de préférence le matin de bonne heure pour éviter les brûlures.

### MILDIOU -

Quelques petits foyers sont signalés çà et là, notamment à Porto-Vecchio, en plaine orientale, en Marana et à Patrimoine. Prévoir un dernier traitement près de la véraison avec un produit cuprique persistant (bouillie bordelaise). Dans les foyers existants on pourra avancer cette intervention si des pluies venaient à être annoncées.

### ACARIENS -

Des foyers se développent actuellement en particulier en Marana, Casinca et dans la région d'Aghione. Surveiller les parcelles habituellement infestées pour intervenir seulement si le seuil de 30 % des feuilles occupées par au moins un acarien rouge ou jaune est dépassé.

### CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE -

Les traitements aériens seront exécutés les 5-6-7 Juillet dans les foyers de

la Marana, Casinca et Patrimonio .A signaler que ce traitement présente également une efficacité préventive vis à vis des Tordeuses de la grappe .

## **ARBRES FRUITIERS**

### **MOUCHE DE L'OLIVE -**

Le premier vol est très intense depuis une huitaine de jours en zone littorale et les premières piqûres sur Picholines viennent d'être observées en situations précoces .Les dates de traitement dépendront de la technique de lutte choisie :

Lutte par pulvérisation localisée d'appâts empoisonnés = démarrer dès à présent la protection dans les vergers de Picholines en zone de basse altitude (moins de 200 mètres). Cette méthode nécessite la surveillance précise des vols de mouches par la mise en place de pièges dans l'olivieraie à protéger .Pour plus de renseignements s'adresser au Service de la Protection des Végétaux - 22, Cours Grandval - 20000 AJACCIO (une brochure technique sera envoyée moyennant 2 timbres pour frais d'envoi) .

Lutte classique par pulvérisation d'un insecticide sur la totalité de l'arbre . En oliveraie de conserve attendre l'observation des toutes premières piqûres pour intervenir .En oliveraie à huile attendre que le seuil de 10 olives piquées soit atteint .

Nous précisons que les olives deviennent sensibles aux attaques lorsqu'elles ont atteint un diamètre de 9 mm, stade déjà atteint en situations précoces .

## **CULTURES LEGUMIERES**

### **TEIGNE DU POIREAU -**

Les vols s'intensifient dans toute la Corse et des dégâts sont déjà importants . En situations non protégées intervenir sans tarder avec de préférence un produit à action de choc type parathion .

